

CORONAVIRUS (COVID-19)

VEUILLEZ SUIVRE CES CONSIGNES

pour éviter la propagation de la COVID-19 à l'intérieur de la succursale.


PLEASE FOLLOW THESE INSTRUCTIONS

in the store to prevent the spread of COVID-19.



En raison de la situation, nous limitons le nombre de clients à dans la succursale.

In light of the current situation, the number of clients permitted in our store is limited to



Restez à la maison si vous : / **Stay home** if you:

- présentez des symptômes, même légers, associés à la COVID-19*;
Have symptoms associated with COVID-19, even if mild.*
- avez reçu la consigne de vous isoler chez vous;
Have been advised to self-isolate at home.
- revenez d'un voyage à l'extérieur du Canada depuis moins de 14 jours.
Have returned from travel outside of Canada in the last 14 days.



Mettez votre masque ou votre couvre-visage avant d'entrer dans la succursale.

Put on your mask or face covering before entering the store.




Désinfectez vos mains avec la solution à base d'alcool mise à votre disposition.

Disinfect your hands with the alcohol-based solution provided.



Toussez ou éternuez dans un papier-mouchoir ou dans le creux de votre bras.

Cough or sneeze into your elbow or in a tissue.



Maintenez une distance physique de 2 mètres avec les autres personnes.

Maintain social distancing of 2 metres.



Respectez la signalisation en place lorsque vous circulez dans la succursale.

Follow the signage when walking through the store.



Méthodes disponibles pour le renouvellement d'ordonnance :

Available ways to renew your prescriptions:

Nous offrons le service de livraison. / Home delivery service available.

Merci de votre collaboration. / Thank you for your collaboration.

* Fièvre, toux (nouvelle, persistante ou aggravée), essoufflement, difficulté à respirer, perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale, grande fatigue, perte d'appétit importante, douleurs musculaires généralisées, mal de gorge, écoulement nasal, congestion nasale, nausées, vomissements, diarrhée ou maux de ventre.

* Fever, cough (new, persistent or aggravated), shortness of breath, difficulty breathing, sudden loss of smell without nasal congestion, severe fatigue, significant loss of appetite, generalized muscle pain, sore throat, runny nose, nasal congestion, nausea, vomiting, diarrhea or upset stomach.

Pharmacie affiliée à
Pharmacy affiliated with

